

DR. ALBERTO ANGEL HOYOS

MEDICINA INTERNA

UNIVERSIDAD DE CALDAS

GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGÍA Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Carrera 13 No. 1N - 35 Piso 5 Consultorio 501 Teléfonos: 746 1686 - 745 0102

Preparación para Rectosigmoidoscopia

Nombre: _____ Fecha:

DD	MM	AA
----	----	----

RECOMENDACIONES:

Ver instrucciones de uso al respaldo.

Comprar 2 **Travad Enema** x 133 mL

NO PERMITA
que le cambien **Travad**
por otro medicamento

DÍA ANTERIOR AL EXAMEN

1. Todo lo que consuma debe ser líquido (sopas, jugos, coladas, cremas etc.)
2. Colocar 1 lavado (ENEMA EVACUANTE) a las 9:00 p.m.

DÍA DEL EXAMEN:

1. Colocar 1 lavado (ENEMA EVACUANTE) a las 6:00 a.m.

NO CONSUMIR NADA DE ALIMENTOS SÓLIDOS, NO CONSUMIR LACTEOS.

VENIR ACOMPAÑADO (A) Y EN AYUNAS

El servicio de sedación tiene un costo de

TOMAR ABUNDANTE LIQUIDO

Su cita es el día _____ a las _____

NOTA:

Si usted tiene falla cardiaca, renal, desequilibrios electrolíticos en fósforo o en calcio, obstrucción del colon, es menor de 12 años o está en embarazo, por favor, consulte a su médico antes de realizar esta preparación.

INSTRUCCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PRODUCTOS TRAVAD



Antes de iniciar la administración, lea cuidadosamente las instrucciones de uso.

TRAVAD ORAL X 133 mL



Refrigere el frasco de TRAVAD ORAL X 133 mL.



Diluya en 250 mL de agua o jugo de naranja.




Mezcle bien.



Ingera el contenido en dos tomas, con un intervalo de 10 minutos.


TRAVAD ENEMA 133 mL



Retire el protector de la cánula rectal azul (a).



Acuéstese de medio lado e inserte la cánula (a) suavemente en el recto.



Rompa la válvula verde (b) flexionando hacia arriba y hacia abajo repetidas veces.




Oprima la bolsa con una mano hasta vaciar su contenido completamente.




Retire la cánula (a), retenga el líquido de 3 a 5 minutos y luego evacúe.

TRAVAD ENEMA 1000 mL




Cierre la llave corrediza de color blanco.



Retire el protector de la cánula rectal azul (a).



Acuéstese de medio lado e inserte la cánula (a) suavemente en el recto.



Rompa la válvula verde (b) flexionando hacia arriba y hacia abajo repetidas veces.



Abrir la llave corrediza de color blanco para permitir el paso del líquido.



Aprieta la bolsa con una mano o colóquela bajo su brazo hasta vaciar el contenido. La aplicación debe ser intermitente, cerrando y abriendo la llave corrediza de color blanco.



Retire la cánula (a), retenga el líquido de 10 a 15 minutos y luego evacúe.

